

Осмотр невролога и педиатра.  
Тихомирова Софья Алексеевна  
27.11.2012 г. г. Самара, ул. 5-я Просека  
д. 101А, кв. 68.

Исходно на заданную речевое развитие  
психическое - затруднён контакт  
с детьми.

Со стороны ЧММ - без особенностей.  
Двигательных нарушений нет.  
Моторный тонус физиологичен.  
Координация движений не наруше-  
на. Чувствительность - норма.  
Во время осмотра ребёнок возбуждён,  
избегает зрительного и тактильного  
контакта. Нарушены поведенче-  
ские возможности головного мозга.

Наблюдается педиатром с на-  
лодами на боли в области тазово-  
та, склонность к запорам. Чис-  
лоты псевдоинфекционно-кишечного  
расстройства.

Д. 5. Детский аутизм F. 84.01.

Выраженная задержка психо-  
речевого развития.

Специфическое системное пероральное



Высокие речи (II-III уровень речевого развития). Псевдоалкогольно-кишечное расстройство. Запор.


Рекомендации по лечению.

- кратко - 1. Глиатилин 6/мг 3 шт. - 10 дней  
2. Глиатилин 1 капс. - 2 р. д. 60 дней  
3. Вымпоуцил 5 мг x 2 р. д. 30 дней  
4. Витамин D<sub>3</sub> 15. x 1 р. д. 45 дней.  
500 ME.

- много - 1. Кортексин 10 мг. в/м 10 дней.  
2. Пантогам таб. 15. x 2 р. д. 60 дней.  
3. Мамий В. 6 10 мг. x 2 р. д. 60 дней  
4. Синакс 2 р. в день 30 дней.  
5. Омелон 3-6-9 1 кап. x 1 р. 90 дней.  
6. Мимекс 1 кап. 3 р. д. 60 дней

- авиает - 1. Церебролизин 5 мг. 10 дней  
2. Ликамилон 50 мг. x 2 р. д. 30 дней  
3. Мелитин 1 кап. x 1 р. д. 90 дней

- сентябрь - 1. Мексидол 5 мг. в/м  
1 р. N 10.  
2 Мексидол таб. 15 таб x 1 р. д. N 30.



3. Актовегин 5 мл x 1 р. д. N 10 в/м
4. Актовегин таб. 1 р. д. x 1 т 30 дней
5. Церасан 4 мл. x 2 р. в день 60 дней
6. Эльжар 1 ч. л. x 1 р. д. 60 дней.

сентябрь 1. Пантогамин 150 мл.  
1 ч. л. x 2 р. в день 90 дней

2. Гемотен 2 т x 2 р. 60 дней.
3. Церебрум композиция в/м 10 дней
4. Козмидин композиция в/м 10 дней
5. Эрас 306 5 капель x 2 р. 60 дней.
7. Комбилид D3 таб. в день 30 дней

- октябрь 1. Энцергидол 1 т x 2 р. 60 дней
2. Релидрут 250 мл 1 т x 1 р. д. 60 дней
  3. Комитум сироп 1 кап x 1 р. д. 30 дней
  4. Марипам (витамины B) в/м N 10.
  5. Витамины Супрадин 1 т x 1 р. N 60

Рекомендации по лечению  
псевдоочной - кишечного тракта

1. Гутаммакс 10 кап x 1 р. 30 дней
2. Дюфалак 1 ч. л. x 1 р. 90 дней



3. Месбуприм 200 мл 1 т x 1 р. 30 дней  
(при болях в животе).
4. Мотилиум 1 т x 1 р. 30 дней.  
(при вздутиях в животе).
5. Микроцим 10 т. е. 1 т x 1 р.  
каждый день во время еды.
6. Омез 1 т x 2 р. 60 дней (утром по еде)
7. Креон 10 т. е. 1 т x 1 р. 30 дней.
8. Дюспатамин кот. 1 р x 1 р. 60 дней.
9. Урсосан 250 мл 1 т x 2 р. д 60 дней
10. Эссенциале форте 2 т x 2 р. д 30 дней.

15.05.2023 г.

Врач-педиатр Мендрик В.А.

